

HVI y/o IC » Piense en ATTR^{1,2}



LOS PACIENTES CON ATTR-CM YA ESTÁN EN SU CONSULTA

ATTR: amiloidosis por transtiretina; **ATTR-CM:** amiloidosis cardiaca por transtiretina.

1. Davies DR, Redfield MM, Scott CG, et al. A Simple Score to Identify Increased Risk of Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. *JAMA Cardiol.* 2022;7(10):1036-1044; 2. Naito T, Nakamura K, Abe Y, et al. Prevalence of transthyretin amyloidosis among heart failure patients with preserved ejection fraction in Japan. *ESC Heart Fail.* 2023;10(3):1896-1906; 3. Ruiz-Hueso R, Salamanca-Bautista P, Quesada-Simón MA, et al; PREVAMIC Investigators Group. Estimating the Prevalence of Cardiac Amyloidosis in Old Patients with Heart Failure-Barriers and Opportunities for Improvement: The PREVAMIC Study. *J Clin Med.* 2023;12(6):2273.

Solo para profesionales sanitarios.

© 2025 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.

Alnylam Pharmaceuticals Spain S.L., Paseo de la Castellana 141 - 4ª planta 28046, Madrid

 **Alnylam**[®]
PHARMACEUTICALS

PREVALENCIA DE ATTR-CM EN PACIENTES MAYORES CON IC

ESTUDIO PREVAMIC: ESTUDIO OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO Y MULTICÉNTRICO EN 30 HOSPITALES ESPAÑOLES³

1 DE CADA 5 PACIENTES TIENEN IC CAUSADA POR AC³

PACIENTES DE AL MENOS

65 años

DIAGNOSTICADOS CON **IC** Y QUE PRESENTABAN
UN **GROSOR DEL VI > 12 MM³**



16,78%

DE LOS PACIENTES (n= 453) **TENÍA**
ATTR-CM³

- La AC, especialmente la **ATTRwt-CM**, es una causa común, infradiagnosticada y relacionada con la edad de **insuficiencia cardíaca**.
- Debe sospecharse en **pacientes de avanzada edad con insuficiencia cardíaca y aumento del grosor de la pared ventricular izquierda**, independientemente del sexo del paciente o de la fracción de eyección ventricular izquierda, incluso si el paciente ya tiene una enfermedad cardíaca conocida.³

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL
ESTUDIO PREVAMIC, ESCANEE EL QR



AC: amiloidosis cardíaca; **ATTR-CM:** amiloidosis cardíaca por transtiretina; **ATTRwt-CM:** amiloidosis cardíaca por transtiretina wild-type o de tipo salvaje;
IC: insuficiencia cardíaca; **VI:** ventrículo izquierdo.